

Antisedan®

Atipamezole Hidroklorid



FORMÜLASYONU

Her ml içerisinde etkin madde olarak 5 mg atipamezole hidroklorid içermektedir.

ENDİKASYONLARI

Antisedan® kedi ve köpeklerde medetomidine'e bağlı sedatif ve diğer etkilerin eliminasyonunda endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Antisedan® kedi ve köpeklere kas içi yolla medetomidine uygulamasından 15-60 dakika sonra uygulanır. Hayvanların medetomidine'e bağlı sedasyondan normale dönmesi 5-10 dakika içerisinde gerçekleşir.

Köpeklerde Antisedan'ın $\mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık olarak dozu medetomidine'in 5 katıdır.

Pratik uygulamada $40 \mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık (0.4 ml/10 kg) medetomidine uygulanan bir köpeğe, $200 \mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık Antisedan (0.4 ml/10 kg) uygulanmalıdır.

Kedilerde Antisedan'ın $\mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık dozu, medetomidine'in 2.5 katıdır.

Pratik uygulamada $80 \mu\text{g}/\text{kg}$ (0.4 ml/5 kg) medetomidine uygulanan kediye $200 \mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık Antisedan (0.2 ml/5 kg) uygulanmalıdır. Kedilerde Antisedan'ın $\mu\text{g}/\text{kg}$ canlı ağırlık dozu, daha önce uygulanan medetomidine dozunun 4 katını aşmamalıdır.

UYARILAR

Köpeklerde medetomidine yalnız başına ya da butorfanol ile birlikte tiyopental-halotan anestezisinden önce preanestezik olarak kullanılmış ise, Antisedan medetomidine'in etkilerini geri döndürmek ve anesteziden çıkışı hızlandırmak amacı ile post-operatif dönemde kullanılabilir.

Antisedan'ın post-operatif dönemde uygulanması bilincin hızla yerine gelmesini ve kardiyovasküler depresyon ve hipotermi periyodunun belirgin şekilde azalmasını sağlar.

Kedilerde anestezi amacıyla medetomidine, ketamin ve/veya butorfanol kombinasyonu kullanılmışsa, antisedan anesteziden çıkışı hızlandırmak için post-operatif dönemde kullanılabilir.

Uygulama sonrası hayvanların sakin bir ortamda sedasyondan çıkması sağlanmalıdır.

Antisedan'ın gebe hayvanlarda kullanımı yeterli sayıda hayvan üzerinde çalışılmamıştır. Bu sebeple gebe hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Köpeklerde butorfanol, medetomidine ve ketamin kombinasyonu uygulandığında Antisedan kullanılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10 ml'lik renksiz cam flakonlarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 36 aydır.