

Bopriva™

Agresifliğe Neden Olan Seksüel Davranışların Uzun Süreli Kontrol Altına Alınmasını Sağlayan Anti-GnRF Aşısı

FORMÜLASYONU

Her ml'sinde 400µg 2-10 Gonadotropin Salıverici Faktör (GnRF) içerir.

ENDİKASYONLARI

Post-pubertal dönemdeki boğalarda agresifliğe neden olan seksüel davranışların uzun süreli baskılanması amacı ile testosteronun, düvelerde ise östrus davranışlarının geçici bir süre baskılanması için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Bopriva'nın birinci dozu etkinin başlamasının istendiği tarihten en az 4-5 hafta önce uygulanmalıdır. Bopriva'nın ikinci dozu , GnRF aktivitesini inhibe etmek için birinci dozdan en az 3 hafta sonra yapılmalıdır.

Tüm durumlarda 1 ml'lik doz deri altına (subkutan) enjekte edilir. Aşı kulağın hemen arkasından boynun yukarı ve yan tarafından deri altına uygulanmalıdır. Başka bir bölgeden aşılama yapmayınız. Aşı enjekte edilmeden önce, istenirse metil alkol v.b. bazı antiseptikler emdirilmiş pamuk ile enjeksiyon bölgesi temizlenebilir.

A. Tek Bir Doz Yapılacaksa

Steril bir hipodermik iğne ve enjektör kullanarak , aşı kabının tıpası dezenfekte edildikten sonra tek bir doz aşı kabından çekilir.

B. Otomatik Güvenli Enjektör ile Uygulama

Aşı kabına aşağıda belirtildiği gibi bir Otomatik Güvenli Enjektör de takılabilir;

- Sterilize plastik başlık ve tüp paketten çıkarılır.
- Metil alkol v.b. uygun bir antiseptik ile aşı tıpası dezenfekte edilir.
- Tüp otomatik güvenli enjektöre bağlanır.
- İğnenin , plastik şişe üzerindeki tıpaya girmesini önleyecek olan plastik kapak kaldırılır.
- Aşının iğne ile alınması için otomatik güvenli enjektörün pistonu birkaç kez bastırılır.



Aşının Uygulanışı

- Kullanmadan önce Otomatik Güvenli Enjektör için verilmiş temizleme ve kullanma talimatlarını okuyunuz.
- Aşılama sırasında temizliğe her zaman önem veriniz. Aşının, iğnenin ve enjektör parçalarının steril olmayan yüzeyler veya yıkanmamış eller ile kontağı sonucu kontamine olmaması için dikkat edilmelidir.
- İğneler keskin ve temiz olmalıdır. Sıklıkla değiştirilmelidir.
- Aşığı boyun kaslarına enjekte etmemek için mümkün olan en kısa iğne uçları kullanılmalıdır ve boyları 15 mm yi geçmemelidir.
- Mümkünse hayvanlar dışarıda tozlu ortamlarda veya yağmurlu,islak havalarda aşılammamalıdır. Islak ve çamurlu deri bölgelerine uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Aşı kulağın hemen arkasından boynun yukarı ve yan tarafından deri altına uygulanmalıdır. Otomatik Güvenli Enjektör deri yüzeyine 45°C açılı ile sokulmalıdır. Aşılama yapılırken deri el ile yukarı kaldırılmamalıdır. Başka bir bölgeden aşılama yapmayınız.

UYARILAR

Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız. Bu ürün damızlık stoklarında kullanılmaz. Kaza ile kendi kendine enjekte edilmesi hem erkek hem kadınlarda, hem de gebelerde infertiliteye ve seksüel organlarda atrofiye neden olabilir. Aşı, gebe kalabilecek yaştaki kadınlar tarafından uygulanmamalıdır. Eğer kaza ile kendi kendine bir enjeksiyon yapılmış ise derhal doktora başvurulmalıdır. Koruyucu olarak Tiyomersal içerir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et için 0 gün. Damızlık hayvanlarda kullanımı önerilmemektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

50 (ml) doz veya 100 (ml) doz'luk çoklu doz içeren yastık tipi polietilen (plastik) kaplarda sunulur.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

2° ila 8° C arasında (Buzdolabında. Dondurmayınız) muhafaza ediniz. Işıktan koruyunuz. Kullanılmayan aşı ilk açıldıktan sonra ancak 30 güne kadar muhafaza edilip kullanılabilir. Kullanılmayan materyalleri, 2° ila 8°C arasında (Buzdolabında) ve orijinal karton kutusunda ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü 24 aydır.