

Cerenia® Enjektabl

Maropitant



FORMÜLASYONU

Her ml içerisinde 10 mg maropitant sitrat monohidrat halinde maropitant ve koruyucu madde olarak 3,3 mg metakrezol içerir.



ENDİKASYONLARI

Cerenia® köpeklerde aşağıdaki durumlarda kullanım için endikedir.

- Diğer destekleyici önlemler ile birlikte kusmanın tedavisi
- Yol tutmasına bağlı oluşan kusma haricindeki kusmanın önlenmesi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Cerenia® enjeksiyonluk çözelti köpeklere günde bir kez, 1 mg/kg vücut ağırlığı (1 ml/10 kg vücut ağırlığı) dozunda derialtı yolla uygulanır. Tedavi birbirini izleyen 5 gün süreyle devam ettirilebilir.

Kusmanın önlenebilmesi için, Cerenia enjeksiyonluk çözelti en az 1 saat önceden uygulanmalıdır. Etki süresi yaklaşık 24 saattir ve bu nedenle, tedavi kusmaya neden olabilecek bir ajanın, örneğin kemoterapi uygulanmasından 1 gece önce uygulanabilir.

UYARILAR

Kusma gastro intestinal tıkanma gibi ciddi, hayvanı büyük ölçüde zayıf düşüren durumlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle uygun diagnostik değerlendirme yapılmalıdır.

Cerenia'nın, kemoterapi nedeniyle meydana gelen kusmanın hem tedavisinde hem de önlenmesinde etkili oldukları gösterilmiş olmakla birlikte, önleme amaçlı kullanım daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu nedenle kemoterapötik ajanların uygulanmasından önce antiemetik uygulanması tavsiye edilir.

Geçimlilik çalışmaları yapılmadığı için, diğer ürünlerle aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır. Maropitant Ca kanallarına karşı afinite gösterdiğinden Ca-Kanalı antogonistleri ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Karaciğer rahatsızlığı bulunan hayvanlarda ve kalp hastalığı olan ya da kalp hastalığına predispoze hayvanlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır.

AMBALAJ ŐEKLİ

Karton kutu ierisinde 20 ml'lik amber renkli ŐiŐelerde sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 24 aydır.