

Cerenia® Tablet

Maropitant

FORMÜLASYONU

Her tablet içerisinde farklı formlar olarak 16 - 24 - 60 - 160 mg maropitant sitrat monohidrat içermektedir.

ENDİKASYONLARI

Cerenia® köpeklerde aşağıdaki durumlarda kullanım için endikedir.

- Diğer destekleyici önlemler ile birlikte kusmanın tedavisi
- Yol tutmasına bağlı oluşan kusma haricindeki kusmanın önlenmesi

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Cerenia® tablet köpeklere oral yolla uygulanır. Tabletleri blisterden çıkarmak için, blister makas işareti ile gösterilen her iki tablet arasındaki delikli hat boyunca bükülür ya da kesilir. Kesilen parçanın bir kısmı sıkıca tutulurken diğer kısmı blisterin merkezine doğru tablet ortaya çıkıncaya kadar çekilir. Tablet alınarak aşağıda önerildiği şekilde uygulanır. Blistere arka kısımdan baskı uygulamak yoluyla tabletin çıkarılmaya çalışılması tablete ve blisterlere zarar verebileceği için yapılmamalıdır.

Yol tutması haricindeki kusmanın tedavi ve önlenmesi

Kusmayı önleme ve tedavi için, Cerenia tabletler 2 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda uygulanmalıdır. Tabletler orta çizgisi boyunca ikiye bölünebilir. Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir.

Kusmanın önlenmesi için Cerenia tablet 1 saat önceden verilmelidir. Etki süresi yaklaşık 24 saattir. Bu nedenle uygulama kusmaya neden olabilecek ajanın (örneğin kemoterapi) verilmesinden önceki gece yapılabilir.

Cerenia kusmanın önlenmesi ve tedavisi için günlük olarak 5 gün süreyle kullanılabilir.

Pratik doz tablosu

Yol tutması haricindeki kusmanın tedavi ve önlenmesi			
Köpek vücut ağırlığı (kg)	Tablet sayısı		
	16 mg	24 mg	60 mg
3-4*	1/2		
4.1-8	1		
8.1-12		1	
12.1-24		2	
24.1-30			1
30.1-60			2

*Ağırlığı 3 kg'dan az olan köpekler için doz hesaplaması tam olarak yapılamamaktadır

Yol tutmasına bağlı kusmanın önlenmesi

Yol tutmasına bağlı kusmayı önleme için, Cerenia tabletler 8 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda uygulanmalıdır. Tabletler orta çizgisi boyunca ikiye bölünebilir. Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir.

Tabletler seyahate çıkmadan en az 1 saat önce verilmelidir. Antiemetik etki en az 12 saat sürer. Bu nedenle sabah erken yola çıkılacağı durumlarda gece uygulama yapılabilir. Tedavi maksimum 2 gün üstüste uygulanabilir. Bazı köpeklerde 2. doz uygulamasında daha düşük dozlar yeterli olabilir.

Yol tutmasının önlenmesi				
Köpek vücut ağırlığı (kg)	Tablet sayısı			
	16 mg	24 mg	60 mg	160 mg
1-1.5		1/2		
1.6-2	1			
2.1-3		1		
3.1-4	2			
4.1-6		2		
6.1-7.5			1	
7.6-10				1/2
10.1-15			2	
15.1-20				1
20.1-30				1 1/2
30.1-40				2
40.1-60				3

UYARILAR

Cerenia tabletler çözünme ve etki göstermeyi geciktireceği için mama içerisinde karıştırılarak uygulanmamalıdır. Köpeklerin uygulama sonrası tabletleri yuttuğundan emin olunmalıdır.

Kusma gastro intestinal tıkanma gibi ciddi, hayvanı büyük ölçüde zayıf düşüren durumlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle uygun diagnostik değerlendirme yapılmalıdır.

Cerenia'nın, kemoterapi nedeniyle meydana gelen kusmanın hem tedavisinde hem de önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiş olmakla birlikte, önleme amaçlı kullanım daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu nedenle kemoterapötik ajanların uygulanmasından önce antiemetik uygulanması tavsiye edilir. Karaciğer rahatsızlığı bulunan hayvanlarda ve kalp hastalığı olan ya da kalp hastalığına predispoze hayvanlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır.

AMBALAJ ŐEKLİ

Karton kutu ierisinde 4 tablet ieren blister iinde sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 36 aydır.