

Lyme Vax

Lyme Aşısı



KOMPOZİSYONU

Borellia burgdoferi bakterini içeren, köpek lyme hastalığı aşısıdır.

ENDİKASYONLARI

Borrelia burgdoferi'nin neden olduğu hastalıkların önlenmesi amacıyla 9 haftalık veya daha büyük sağlıklı köpeklerin aşılmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Aseptik teknik kullanılarak köpeklere derialtı yolla 1 ml doz enjekte edilir. İkinci doz 2-3 hafta sonra yapılmalıdır. Her sene tek dozluk tekrar aşılması önerilir.

UYARILAR

Hedef türler için özel uyarı: Aşı uygulamasından sonra enjeksiyon bölgesinde geçici lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafilaktik reaksiyon şekillenirse epinefrin uygulayınız.

Kullanımda dikkat edilecek özel durumlar: Aşı şişesi iyice çalkalanmalı ve içerik hemen enjekte edilmelidir. Anafilaktik reaksiyon şekillenirse antidot olarak epinefrin uygulayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ

1 dozluk plastik şırıngada veya 1 veya 10 dozluk cam veya plastik ambalajlarda sunulmaktadır.