

ORAL NON-STERÖİD ANTİİNFLAMATUAR

Trocoxil®

Mavacoxib



FORMÜLASYONU

Her tablet etken madde olarak, farklı formlarda 6-20-30-75-95 mg mavacoxib içermektedir.

ENDİKASYONLARI

Trocoxil chewable tablet 12 aylık ya da daha yaşlı köpeklerde, 1 aydan uzun süre tedaviye gerek duyulan durumlarda, dejeneratif eklem hastalığı ile ilişkili yangı ve ağrının tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Oral yolla uygulanır.

GÜNLÜK OLARAK UYGULANAN BİR NSAİD DEĞİLDİR.

Önerilen doz 2 mg mavacoxib kg vücut ağırlığıdır. Uygulama genel öğünden hemen önce ya da birlikte verilmelidir. Tablet köpek tarafından alındığı kontrol edilmelidir. Uygulama 14 gün sonra tekrar edilir. Daha sonra doz aralığı 1 ay olarak uygulanmalıdır. Tedavi toplam 7 uygulamayı aşmamalıdır (6.5 ay). Pratik uygulamada vücut ağırlığı 5-6 kg olan köpeklere 2 tablet uygulanır.

Farklı vücut ağırlıklarındaki köpeklere önerilen farmakolojik dozun (2 mg/kg vücut ağırlığı) uygulanabilmesi için Trocoxil tabletlerin diğer formları aşağıdaki tabloda önerildiği şekilde kombine edilebilir. Örnek olarak, vücut ağırlığı 21-23 kg arasında olan köpeklere 20 mg'lık tablettten 1 adet ve 30 mg'lık tablettten 1 adet verilebilir. Benzer şekilde vücut ağırlığı 48-52 kg arasında olan köpeklere 30 mg'lık tablettten 1 adet ve 75 mg'lık tablettten 1 adet verilebilir.

Pratik uygulama tablosu

Vücut ağırlığı (kg)	Uygulanacak tabletlerin sayısı ve gücü				
	6 mg	20 mg	30 mg	75 mg	95 mg
5-6	2				
7-10		1			
11-15			1		
16-20		2			
21-23		1	1		
24-30			2		
31-37				1	
38-47					1
48-52			1	1	
53-62			1		1
63-75				2	

UYARILAR

Mavacoxib düşük eliminasyon oranına bağlı olarak uzun bir plazma yarılanma ömrüne sahiptir (> 80 gün). İkinci dozun uygulanmasından sonra etki süresi 1-2 ay olabilmektedir. Uzun süreli NSAID tedavisini tolere edemeyecek hayvanların tedavisinden kaçınılmalıdır.

Troxocil ile tedavi başlatılmadan önce hayvan ayrıntılı olarak muayene edilmelidir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk ya da protein ve kan kaybına neden olan enteropati geçiren hayvanlar Trocoxil ile tedaviye uygun değildirler. Aynı muayenenin tedavi başladıktan 1 ay sonra ve 3. dozun uygulanmasından önce yapılması önerilmektedir. Mavacoxib safra yoluyla atıldığı için karaciğer fonksiyonları bozuk olan hayvanlarda eliminasyon olumsuz yönde etkilenecek vücutta aşırı birikim görülebilir.

Troxocil kullanılan hayvanların dehidrasyon ve hemodinamik dengenin bozulmasına neden olabilecek durumlar ya da anestezi ve cerrahi

müdahaleye maruz kalması durumunda hidrasyon ve hemodinamik dengeyi devam ettirici önlemler alınmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

6-20-30-75-95 mg formlarda, karton kutu içinde, her biri iki tablet içeren blisterlerde sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 36 aydır.