

## Ultrabac 8

**Clostridium chauvoei- Cl. septicum-Cl. haemolyticum- Cl. novyi- sordelli- Cl. perfringens tip C ve D bakterin- toksoidi**

### FORMÜLASYONU

Öldürülmüş, standardize edilmiş Clostridium chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii ve Cl. perfringens C ve D Tipi bakterin-toksoidlerinden ve adjuvanattan oluşmaktadır.

### ENDİKASYONLARI

Yanıkara hastalığı (Cl. chauvoei), malign ödem veya Bradzot (Cl. septicum), İnfeksiyöz nekrotik hepatitis (Cl. novyi), İnfeksiyöz ikter basiller hemoglobinüri (Cl. haemolyticum), Cl. sordelli enfeksiyonu ve Cl. perfringens C ve D tipi enteroteksemi hastalıklarının önlenmesi için sağlıklı inek ve koyunlarda kullanılır. Cl perfringens tip B'ye karşı bağışıklık, C tipi (beta) ve D tipi (epsilon) fraksiyonlarının kombinasyonlarına karşı oluşturulan bağışıklıkla sağlanır.

### UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Aseptik şartlar altında deri veya kas içi yolla ineklere 5 ml. ve koyunlara 2.5 ml enjekte edilir ve dört ile altı hafta sonra aşı tekrarlanır. Cl. haemolyticum için, etkene yeniden maruz kalabilecek hayvanlarda doz her beş ile altı ayda bir tekrarlanır. Besiye alınacak veya hali hazırda besiye alınmış olan hayvanlarda enjeksiyonun sadece deri altı yolla yapılması tavsiye edilir. Yüksek düzeyde bağışıklık sağlamak için aşı her yıl tekrarlanmalıdır.

### UYARILAR

Kesimden önceki 21 gün içinde aşı yapılmamalıdır. Aşı kullanılmaya başlandıktan sonra içeriğin tamamı kullanılmalıdır. Biyolojik ürünlerin kullanımından sonra anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir. Epinefrin dahil, semptomatik tedavi uygulanmalıdır.



### **AMBALAJ ŐEKLİ**

50 ml'lik plastik flakonlarda 10 siđır/20 koyun, 250 ml'lik plastik flakonlarda 50 siđır/100 koyun dozu olarak sunulmaktadır.