

Bronchicine™ CAe

Köpek Bronchitis Aşısı



FORMÜLASYONU

İnaktif Bordetella bronchiseptica aşısıdır.

ENDİKASYONLARI

Sekiz haftalık ve daha yaşlı köpeklerde Bordetella bronchiseptica'nın neden olduğu köpeklerdeki Enfeksiyöz Trakeo Bronşit'in kontrolüne yardımcı olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

- **Genel talimatlar:** Köpeklere aseptik olarak deri altı yolla 1 mL uygulanır. Uygulamada boynun arka tarafı tercih edilmelidir. Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Sadece deri altı enjeksiyonla uygulanmalıdır.
- **Primer aşılama:** Sekiz haftalık yaşta ya da daha büyük sağlıklı köpeklere tek doz olarak 1 mL uygulanır.
- **Tekrar aşılama:** 2-4 hafta sonra ikinci bir doz uygulaması yapılmalıdır.
- **Yıllık tekrar:** Aşının her yıl 1 mL'lik tek dozla tekrarlanması önerilir.

UYARILAR

Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Dispozabl steril enjektör kullanılmalıdır.

Aşılama sonrası anafaksi şekillenirse derhal epinefrin veya benzeri bir ilaç uygulanmalıdır. Destekleyici tedavi düşünülmelidir.

Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

Sadece veteriner hekim kullanımına mahsustur.

AMBALAJ ŞEKLİ

Bronchicine CAe; tek dozluk şişelerde sunulmaktadır.