

Duramune CvK

Köpek Coronavirüs Aşısı



FORMÜLASYONU

İnaktif Canine Coronavirus aşısıdır.

ENDİKASYONLARI

Köpek coronavirusün neden olduğu hastalıkların önlenmesi amacıyla 6 haftalık veya daha büyük sağlıklı köpeklerin aşılmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Aseptik teknik kullanılarak köpeklere derialtı veya kas içi yolla 1 ml doz enjekte edilir. 12 haftalıktan büyük tüm köpeklere başlangıç olarak bir doz Duramune Cv-K yapılması ve ikinci dozun da takip eden 2 - 3 hafta içinde yapılması gerekir. Her sene tek dozluk tekrar aşılması önerilir. Aşılama programının 6 haftalıktan itibaren başlatılması gerekir. Maternal antikorların varlığının aktif bağışıklığın gelişmesini etkilediği bilinmektedir. Köpek yavrularının 12 haftalık olana kadar 2 - 3 haftada bir aşılması gerekir.

UYARILAR

Hedef türler için özel uyarılar: Aşı uygulamasından sonra enjeksiyon bölgesinde geçici lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafilaktik reaksiyon şekillenirse epinefrin uygulayınız.

Kullanımda Dikkat Edilecek Özel Durumlar: Aşı şişesi iyice çalkalanmalı ve içerik hemen enjekte edilmelidir.

Anafilaktik reaksiyon şekillenirse antidot olarak epinefrin uygulayınız. 2 - 7 °C'de karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. İyice çalkalayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ

1 dozluk plastik şırıngada veya 1,5 veya 10 dozluk cam veya plastik konteynerlerde sunulmaktadır.